

Cirurgia de implantes

Casos clínicos de cirurgia
realizada em região anterior

As cirurgias de implantes osseointegrados devolvem ao paciente a função, estética e auto-estima.

Apresento a seguir alguns casos clínicos que foram perdidos um ou mais dentes e foi feito a cirurgia de implantes e reabilitado com prótese sobre o implante .

A fase cirúrgica, enxerto ósseo e provisório foi realizada por mim. Tratamento estéticos, reabilitadores (prótese) e de ortodontia foram ou serão feitos por outros profissionais especialista na devida área de atuação.

Durantes esses anos na minha especialidade já realizei mais de 3500 implantes, mas mesmo assim busco o aprimoramento com estudo, congressos, cursos para praticarmos técnicas mais eficazes e com melhores resultados.

Juntamente com isso contamos com equipamentos, implantes, biomateriais mais atuais e com mais estudos para praticarmos uma odontologia de excelência.

Implante região anterior – perda do dente por fratura – foi realizado remoção do dente fraturado e cirurgia de implante com provisório sobre o implante no mesmo procedimento



Reabilitação: Dr. Jorge Augusto

Implante região anterior – perda do dente por reabsorção –
foi realizado remoção do dente e cirurgia de implante com
provisório sobre o implante no mesmo procedimento



Inicial



Provisório no ato da cirurgia



Controle de 1 mês após a cirurgia



Após período de cicatrização da cirurgia será
encaminhado para tratamento reabilitador

Implante região anterior – perda por fratura de 2 elementos anteriores – foi realizado remoção do dente fraturado e cirurgia de implante com provisório sobre o implante no mesmo procedimento



inicial



Reabilitação: Dr. Jorge Augusto



A cirurgia foi feita em 2 estágios: 1º. em um dente e depois que a gengiva cicatrizou, foi feito o outro dente .



30 dias após a cirurgia



Implante região anterior – perda dente por fratura – foi realizado remoção do dente e cirurgia de implante com provisório sobre o implante no mesmo procedimento



Provisório sobre o implante



60 dias após a cirurgia de implante

Após período de cicatrização da cirurgia será encaminhado para tratamento reabilitador

Implante região anterior – perda do dente por fratura – foi realizado remoção do dente fraturado e implante com provisório sobre o implante no mesmo procedimento



Após período de cicatrização da cirurgia será encaminhado para tratamento reabilitador

Implante região anterior – perda do dente por fratura – foi realizado remoção do dente fraturado e cirurgia de implante com provisório sobre o implante no mesmo procedimento



Inicial



1 mês após a cirurgia



Após período de cicatrização da cirurgia será encaminhado para tratamento reabilitador



Implante região anterior – perda dente por fratura – foi realizado remoção do dente e cirurgia de implante com provisório sobre o implante no mesmo procedimento



Inicial



Provisório sobre o implante
realizado n dia da cirurgia





1 mês após à cirurgia

Após período de cicatrização da cirurgia será encaminhado para tratamento reabilitador

Implante região anterior – perda dente por fratura – foi realizado remoção do dente e cirurgia de implante com enxerto ósseo



Inicial



Após período de cicatrização da cirurgia será encaminhado para tratamento reabilitador



Reabilitação: Dr. Jorge Augusto



Implante região anterior – perda dente por fratura – foi realizado remoção do dente e cirurgia de implante com provisório sobre o implante no mesmo procedimento

Implante região anterior – perda dente por fratura – foi realizado remoção do dente e cirurgia de implante com provisório sobre o implante no mesmo procedimento




Inicial



Provisório feito no dia da cirurgia



1 mês após a cirurgia



Após período de cicatrização da cirurgia será encaminhado para tratamento reabilitador

Implante região anterior – perda dente por fratura – foi realizado remoção do dente e cirurgia de implante com provisório sobre o implante no mesmo procedimento



Início



Após 15 dias da cirurgia

Após período de cicatrização da cirurgia será encaminhado para tratamento reabilitador

Implante região anterior – dente perdido a mais tempo – foi realizado enxerto ósseo previamente a cirurgia de implante



Provisório colado dente vizinho




Radiografia do
Enxerto ósseo



Após período de cicatrização da cirurgia será encaminhado para tratamento reabilitador

Implante região anterior – perda dente por fratura apical
– prognóstico desfavorável para manter o dente - foi
realizado remoção do dente e cirurgia de implante com
provisório sobre o implante no mesmo procedimento



Inicial



Remoção dente fraturado

Implante e provisório no
mesmo procedimento




Após período de cicatrização da cirurgia será encaminhado para tratamento reabilitador

Implante região anterior – perda dente por fratura – foi realizado remoção do dente e cirurgia de implante com provisório sobre o implante no mesmo procedimento



Após período de cicatrização da cirurgia será encaminhado para tratamento reabilitador

Implante região anterior – perda de 2 dentes por doença periodontal – foi realizado remoção do dente e enxerto ósseo e posteriormente cirurgia de implante osseointegrado




Reabilitação: Dr. Valdir Reis



Implante região anterior – ortodontia para devolver espaço necessário
– cirurgia de implante osseointegrado e provisório sobre o implante



15 dias após a cirurgia



Após período de cicatrização da cirurgia será encaminhado para tratamento reabilitador

Implante região anterior – perda de dente inferior – foi realizado remoção do dente e enxerto ósseo e posteriormente cirurgia de implante osseointegrado



Após período de cicatrização da cirurgia será encaminhado para tratamento reabilitador

Implante região anterior – perda dente anterior - foi realizado remoção do dente e enxerto ósseo e posteriormente cirurgia de implante osseointegrado



Inicial



Dr. Everton Renó Corrêa



Enxerto ósseo



Dr. Everton Renó Corrêa



Após período de cicatrização da cirurgia será encaminhado para tratamento reabilitador

Implante região anterior – perda do dente por fratura – foi realizado remoção do dente fraturado e cirurgia de implante com provisório sobre o implante no mesmo procedimento



Inicial



30 dias após a cirurgia



Após período de cicatrização da cirurgia será encaminhado para tratamento reabilitador

Implante região anterior – perda de dente superior – foi realizado remoção do dente e implante osseointegrado com provisório no mesmo procedimento



Inicial



Dr. Everton Renó Corrêa




30 dias da cirurgia



90 dias da cirurgia

Após período de cicatrização da cirurgia será encaminhado para tratamento reabilitador

Perda de dente anterior por trauma – foi realizado a remoção do dente fraturado, enxerto ósseo e após 6 meses cirurgia de implante osseointegrado com o provisório sobre o implante



Após período de cicatrização da cirurgia será encaminhado para tratamento reabilitador

Implante região anterior – perda do dente por fratura - foi realizado remoção do dente e cirurgia de implante com provisório no mesmo procedimento



Dentes anterior fraturado por trauma . Foi removido o elemento fraturado e realizado enxerto ósseo.

Após 6 meses foi realizado o implante osseointegrado



Reabilitação: Dr. Jorge Augusto

Dente anterior fraturado – foi removido o elemento fraturado e na mesma cirurgia foi realizado o implante e um provisório sobre o implante



Reabilitação Dr. Jorge Augusto

Perda de prótese anterior com 6 elementos ancorada em 2 dentes caninos – foi realizado 2 implantes nas extremidades devolvendo a estética e função



Reabilitação – Dr. Luciano Araújo